Vegetační zpráva

za květen 2026 (Žatecko)

1. Klimatické podmínky v květnu

Sledovaná data	2026	2025	30letý průměr	Rozdíl 25–30letý pr.
Průměrná teplota (°C)	15	13,1	14	1
Max. teplota (°C)	(26. 5.) 30,6	28,9		
Min. teplota (°C)	(1. 5.) -0,5	-1,1		
Počet letních dnů (T_{max} ≥ 25°C)	12	4		
Počet tropických dnů (T_{max} ≥ 30°C)	2	0		
Počet mrazových dnů (T_{min} ≤ 0°C)	1	5		
Počet ledových dnů (T_{max} ≤ 0°C)	0	0		
Měsíční úhrn srážek (mm)	75,5	36,6	51,9	23,6
Max. denní úhrn srážek (mm)	(31. 5.) 28,3	14,8		
Celkový úhrn srážek od 1. 1.	138	118,6	135,2	2,8
Počet suchých dnů	19	17		
Délka slunečního svitu	259,8	238,9		

Pozn.: 30letý průměr 1991-2020 na stanici Žatec

Květen byl z teplotního hlediska nadprůměrný, a to především v důsledku vysokého počtu letních dnů. Druhá dekáda měsíce se vyznačovala chladnějším počasím, kdy minimální přízemní teploty klesaly pod bod mrazu. V závěru měsíce se opět výrazně oteplilo a byly zaznamenány tropické dny - dne 24. 5. byla naměřena max. teplota 30,4 °C a dne 26. 5. dosáhlo teplotní maximum 30,6 °C.

Z hlediska srážek byl květen také nadprůměrný. Celkový úhrn srážek na Žatecku činil 75,5 mm, což odpovídá 145 % dlouhodobého průměru. Pěstitelsky významné srážky byly zaznamenány v období 5. 5. do 7. 5. kdy spadlo celkem 35,5 mm srážek a v poslední den měsíce, kdy bylo naměřeno dalších 28,3 mm. Rozložení srážek však nebylo v rámci celé žatecké oblasti rovnoměrné a mezi jednotlivými lokalitami byly zaznamenány značné rozdíly v jejich úhrnech.

2. Měsíční grafy srážek a teplot

Srážky a průměrná teplota 05/2026 vs. 05/2025



Přehled maximálních a minimálních přízemních teplot 05/2026



3. Roční grafy srážek a teplot





4. Hodnocení zdravotního stavu a vegetace

Letní teploty a dlouho očekávané srážky prvním týdnu měsíce byly příznivé pro růst chmele. Podpořil se vegetační růst a hlavní část zavádění byla zahájena přibližně kolem 7. května. Ochlazení ve druhé dekádě měsíce vedlo ke zpomalení, místy až k zastavení růstu hybridních odrůd. Zavádění probíhalo postupně v závislosti na intenzitě růstu. Tam, kde to stav porostů umožnil, byly v posledním týdnu zahájeny první přiorávky.
Během měsíce byly provedeny druhá a třetí aplikace přípravků proti peronospoře chmelové. Vlivem vyšších teplot byla místa, která byla ošetřena proti svilušce chmelové. Výskyt mšice chmelové byl poslední týden v květnu minimální a na počátku nástupu.

Ke konci května lze zdravotní stav porostů hodnotit jako dobrý.

5. Fotodokumentace

Pohled na chmelnici 31. 5.

Peronospora chmelová

Začátek pazochování

V Žatci 2. 6. 2026, Kateřina Švecová