Vegetační zpráva

za červenec 2026 (Žatecko)

1. Klimatické podmínky v červenci

Sledovaná data	2026	2025	30letý průměr	Rozdíl 26–30letý pr.
Průměrná teplota (°C)	19,9	19,0	19,2	0,7
Max. teplota (°C)	(30. 7.) 37,2	35,6		
Min. teplota (°C)	(25. 7.) 7,3	8,3		
Počet letních dnů (T_{max} ≥ 25°C)	20	15		
Počet tropických dnů (T_{max} ≥ 30°C)	7	4		
Počet mrazových dnů (T_{min} ≤ 0°C)	0	0		
Počet ledových dnů (T_{max} ≤ 0°C)	0	0		
Měsíční úhrn srážek (mm)	41,7	51,6	76,3	-34,6
Max. denní úhrn srážek (mm)	(14. 7.) 10,9	27,4		
Celkový úhrn srážek od 1. 1.	246,1	227,2	276,9	-30,8
Počet suchých dnů	18	13		
Délka slunečního svitu	233,9	175,4	230,7	3,2

Pozn.: 30letý průměr 1991-2020 na stanici ČHMÚ Žatec

Červenec lze charakterizovat jako teplý a suchý měsíc. Přestože jeho začátek měsíce byl chladnější, průměrná měsíční teplota byla o 0,7 °C vyšší než dlouhodobý normál a o 0,9 °C vyšší ve srovnání s loňským rokem. Na tomto vývoji se výrazně podílelo především velmi teplé počasí v posledním červencovém týdnu, kdy maximální denní teplota dosáhla 37,2 °C (30. 7.).

Z hlediska srážek byl červenec podprůměrný. Ve srovnání s dlouhodobým normálem činí srážkový deficit téměř 35 mm. Roční úhrn srážek pak dosahuje 88 % obvyklých hodnot. Stejně jako v předchozích měsících je třeba zmínit, že srážky byly v rámci žatecké chmelařské oblasti rozloženy velmi nerovnoměrně a mezi jednotlivými lokalitami jsou patrné výrazné rozdíly v jejich úhrnech.

Na konci měsíce, dne 31. 7., zasáhla žateckou oblast bouřka doprovázená silným větrem, který způsobil pád chmelnice s odrůdou Žatecký poloraný červeňák o výměře 2,25 ha.

2. Měsíční grafy srážek a teplot

Srážky a průměrná teplota 07/2026 vs. 07/2025



Přehled maximálních a minimálních přízemních teplot 07/2026



3. Roční grafy srážek a teplot





4. Hodnocení zdravotního stavu a vegetace

Vysoké teploty na konci června negativně ovlivnily další fázi růstu chmele na některých lokalitách v žatecké oblasti. U výsazů založených na podzim 2025 a jaře 2026, stejně jako u starších porostů odrůdy Žatecký poloraný červeňák a odrůd Premiant a Saaz Late, došlo ke spálení vegetačních vrcholů a k předčasnému ukončení dlouživého růstu. Porosty zůstaly špičaté a nedorostly ke stropu konstrukce, přičemž jejich výška zaostávala o 50–150 cm.

Naopak u mladších porostů se díky mírnému ochlazení v průběhu července dlouživý růst nezastavil a pokračoval až do poloviny měsíce. Výrazné rozdíly jsou patrné mezi lokalitami se závlahou a bez závlahy. Na nezavlažovaných lokalitách s omezeným množstvím srážek se na některých místech projevuje výrazný nedostatek půdní vláhy.

Začátek sklizně Žateckého poloraného červeňáku předpokládáme od 17. srpna, hlavní část sklizně pak mezi 22. až 23. srpnem.

Podle odhadu Svazu pěstitelů České republiky, který byl prezentován na mezinárodním chmelařském kongresu na konci července se předpokládá, že letošní sklizeň může být přibližně o 20 % nižší než v předchozím roce, tedy cca o 15 % nižší oproti dlouhodobému průměru.

Charakter počasí v červenci byl příznivý pro rozvoj peronospory chmelové, proto bylo doporučeno provést čtvrté a páté ošetření proti sekundární infekci. Proti mšici a svilušce chmelové byla nadále aplikována ochrana přípravkem Movento 100 SC v dávce 1,5 l/ha. Přes příznivé podmínky nebyl během měsíce zaznamenán zvýšený tlak těchto škůdců.

5. Fotodokumentace



Pohled na chmelnici 31. 7.

Spálený vegetační vrchol

Chmelnice po vichřici

V Žatci 4. 8. 2026, Kateřina Švecová